Ficha Técnica

POPDENT

DENTES ACRÍLICOS

Indicação:
Dentes de dupla prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.

Características/Benefícios:
- Modelário latino-americano permite perfeita harmonia facial.
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Angulação de 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
- As cores Trubyte são conhecidas e utilizadas no mercado nacional.
- Alta durabilidade, possui alta resistência mecânica, química e à abrasão.



Modelos:
ANTERIORES SUPERIORES:
2D, 3M, 2N, 3N, 3P, A25, A26, 263, 264, 266 e 38.
ANTERIORES INFERIORES:
2D, 2N, 3N, 3P, A25, A26 e 266.
POSTERIORES SUPERIORES E INFERIORES:
30M, 32M, 30L, 32L e 34L.

CORES: 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77 e 81.

Tabela de Articulação

ANTERIOR		POSTERIOR
2D	2D	30M - 30L
3M	2D	30M
2N	2N	30L
3N	3N	32M - 30L
3P	3P	32M - 32L
A25	A25	32M - 30M
A26	A26	32M
263	2N	30M - 30L
264	A25	32M - 32L
266	266	34L
38	266	34L

Composição:
- Polimetacrilato de Metila
- Dimetacrilato de Etilenoglicol
- Pigmentos Biocompatíveis
- Fluorescente e Cerâmica Organicamente Modificada

Instruções de Uso:
Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.
Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, asperizar a região inferior do dente com uma fresa diamantada de granulação média (assim é maximizada a superfície de contato com a resina acrílica e são produzidas microfissuras, formando uma base para umedecer com monômero). É recomendada a asperização na região cervical do dente que estará em contato com a resina acrílica, a fim de se obter uma melhor adesão química e, assim, evitar a infiltração de corantes alimentares.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e precauções:
Conservar ao abrigo de luz e calor.
Somente para uso odontológico.
Utilizar tabela de articulação e escala de cor POPDENT.

Contraindicações:
Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro ANVISA: nº 10216040027

Responsável Técnico: Luiz Paulo Ribeiro Junior – CRQ IV - 03251745

1100-PIR-DFU 0070 - Rev02

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial
CEP 13633-418- Pirassununga - São Paulo - Brasil
Fone: +55 (11) 3046 2222 - SAC: 0800 7712226
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73
Indústria Brasileira - Made in Brazil - Hecho en Brasil

DentBras